

UPUTSTVO ZA LEK



Escapelle®; 1,5 mg; tableta
levonorgestrel

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Escapelle i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Escapelle
3. Kako se uzima lek Escapelle
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Escapelle
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Escapelle i čemu je namenjen

Lek Escapelle je hitan (urgentan) kontraceptiv koji može da se primeni u roku od 72 sata (3 dana) nakon nezaštićenog polnog odnosa ili neuspeha kontraceptivne metode.

Lek Escapelle sadrži sintetsku aktivnu supstancu sličnu luteinizirajućem hormonu, koja se zove levonorgestrel. Lek Escapelle sprečava 85% očekivanih trudnoća kada ga primenite u roku od 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa. Tableta neće sprečiti trudnoću u svim slučajevima, ali je efikasnija ako je uzmete što je pre moguće, nakon nezaštićenog polnog odnosa. Bolje je da je uzmete u prvih 12 sati, nego da odlažete do trećeg dana.

Smatra se da lek Escapelle deluje tako što:

- sprečava da Vaši jajnici oslobođe jajnu ćeliju,
- sprečava spermu da oplodi već oslobođenu jajnu ćeliju.

Lek Escapelle sprečava da ostanete u drugom stanju samo ako ga uzmete u roku od 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa. Neće delovati ukoliko ste već u drugom stanju. Ako imate nezaštićeni polni odnos nakon što uzmete lek Escapelle, on Vas neće zaštiti od trudnoće.

Lek Escapelle nije namenjen za primenu pre prvog menstrualnog krvarenja (menarhe).

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Escapelle

Lek Escapelle ne smeti uzimati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na levonorgestrel ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas obratite se svom lekaru pre uzimanja leka Escapelle kao hitne kontracepcije, jer možda nije pogodan za Vas. Lekar Vam može propisati drugu vrstu hitne kontracepcije.

- Ukoliko ste trudni ili mislite da ste možda trudni. Ovaj lek neće delovati ako ste već trudni. Lek Escapelle ne može da prekine trudnoću jer nije „tableta za abortus”.
Možda ste već u drugom stanju ako:
 - Vam menstruacija kasni više od 5 dana ili ako Vam se javi neuobičajeno krvarenje u periodu kada očekujete narednu menstruaciju
 - ste imali nezaštićen polni odnos pre više od 72 sata, a nakon poslednje menstruacije.

Upotreba leka Escapelle se ne preporučuje ako:

- imate oboljenje tankog creva (kao što je Kronova bolest) koje sprečava resorpciju leka,
- imate težih problema sa jetrom,
- ste imali vanmateričnu trudnoću (stanje kada se beba razvija izvan materice),
- ste imali bolest koja se zove salpingitis (zapaljenje jajovoda).

Prethodna vanmaterična trudnoća ili prethodna infekcija jajovoda povećavaju rizik od vanmaterične trudnoće.

Kod svih žena, hitnu kontracepciju treba uzeti što je pre moguće nakon nezaštićenog polnog odnosa. Postoje neki dokazi da efikasnost leka Escapelle može biti smanjena sa povećanjem telesne mase ili indeksa telesne mase (engl. *body mass index*, BMI), ali ovi podaci su ograničeni i ne omogućavaju donošenje konačnih zaključaka. Stoga, Escapelle se i dalje preporučuje svim ženama, bez obzira na telesnu masu ili BMI.

Savetuje se da razgovarate sa zdravstvenim radnikom ukoliko ste zabrinuti u vezi uzimanja hitne kontracepcije.

Deca i adolescenti

Lek Escapelle nije indikovan za primenu pre prvog menstrualnog krvarenja (menarhe).

Ako ste zabrinuti zbog seksualno prenosivih bolesti

Ako niste koristili kondom (ili ukoliko je spao ili se pocepao) tokom polnog odnosa, postoji mogućnost da dobijete seksualno prenosivu bolest ili HIV virus.

Ovaj lek Vas ne može zaštiti od seksualno prenosivih bolesti, to može samo kondom.

Ako ste zabrinuti zbog ovoga, obratite se za savet svom lekaru, medicinskoj sestri, klinici za planiranje porodice ili farmaceutu.

Drugi lekovi i Escapelle

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Neki lekovi mogu da spreče efikasno delovanje leka Escapelle:

- barbiturati i drugi lekovi koji se koriste protiv epilepsije (na primer, primidon, fenitoin i karbamazepin),
- lekovi za lečenje tuberkuloze (na primer rifampicin, rifabutin),
- lekovi za lečenje HIV-a (ritonavir, efavirenz),
- lekovi za lečenje gljivičnih infekcija (grizeofulvin),
- biljni lekovi koji sadrže kantarion (*Hypericum perforatum*).

Ukoliko su Vam potrebni dalji saveti o tačnoj dozi koja Vam je potrebna, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Konsultujte svog lekara što je pre moguće nakon uzimanja tablete, radi daljih saveta o pouzdanom obliku redovne kontracepcije i kako biste isključili mogućnost trudnoće. (Videti odeljak 3. „Kako se uzima lek Escapelle” za dalje savete).

Lek Escapelle takođe može uticati na delovanje drugih lekova:

- lek ciklosporin (koji vrši supresiju imunog sistema).

Koliko često možete uzimati lek Escapelle

Lek Escapelle treba uzimati samo u hitnim slučajevima, a ne kao redovnu metodu kontracepcije.

Ukoliko se lek Escapelle uzme više od jedanput u toku menstrualnog ciklusa biće manje pouzdan i veća je verovatnoća da će poremetiti Vaš menstrualni ciklus.

Lek Escapelle nije efikasan kao redovne metode kontracepcije. Vaš lekar, medicinska sestra ili klinika za planiranje porodice Vam mogu reći više o dugoročnim metodama kontracepcije koje su efikasnije u sprečavanju trudnoće.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća

Ovaj lek ne smete da uzmete ako ste već trudni. Ako zatrudnite i posle uzimanja ovog leka, važno je da se obratite svom lekaru. Nema dokaza da će lek Escapelle naškoditi Vašoj bebi, ako ste ga uzeli kako je opisano. Ipak, Vaš lekar će možda hteti da proveri da li je trudnoća vanmaterična (da li se beba razvija izvan materice). Ovo je posebno važno ako Vam se javi jak bol u abdomenu nakon uzimanja leka Escapelle ili ako ste ranije već imali vanmateričnu trudnoću, operaciju jajovoda ili zapaljenske bolesti organa male karlice.

Dojenje

Veoma male količine aktivne supstance ovog leka mogu da se pojave u Vašem mleku. Ne smatra se da je ovo štetno za bebu, ali ako ste ipak zabrinuti, možete uzeti tabletu odmah nakon podoja i izbegavati dojenje najmanje 8 sati nakon uzimanja tablete. Na ovaj način uzećete tabletu znatno pre narednog podoja i tako smanjiti količinu aktivne supstance koju Vaša beba može da unese putem mleka.

Plodnost

Primena leka Escapelle povećava mogućnost da dođe do poremećaja menstrualnog ciklusa, što ponekad može dovesti do ranije ili kasnije ovulacije. Ove promene mogu dovesti do pomeranja plodnih dana, međutim, nema podataka o uticaju na plodnost u dugoročnom periodu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama nije ispitivan.

Lek Escapelle sadrži laktozu

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

U slučaju intolerancije na mlečni šećer (laktozu) treba imati u vidu da jedna tableta leka Escapelle sadrži 142,5 mg laktoze, monohidrat.

3. Kako se uzima lek Escapelle

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

- Uzmite tabletu što pre, po mogućству u roku od 12 sati, ali najkasnije 72 sata (3 dana) nakon što ste imali nezaštićeni polni odnos. Lek Escapelle se može uzeti bilo kad tokom menstrualnog ciklusa, pod pretpostavkom da niste već trudni ili mislite da ste trudni. Nemojte žvakati, već progutajte celu tabletu sa vodom. Ne odlažite uzimanje tablete. Tableta je efikasnija ako se uzme što ranije nakon nezaštićenog polnog odnosa.
- Ako uzimate neki od lekova koji mogu uticati na delovanje leka Escapelle (videti odeljak „Drugi lekovi i Escapelle“) ili ukoliko ste uzimali neki od ovih lekova tokom prethodne 4 nedelje, efikasnost leka Escapelle može biti smanjena. Vaš lekar može propisati drugu vrstu (nehormonske) hitne kontracepcije, tj. intrauterini dostavni sistem sa bakrom (Cu-IUDS). Ukoliko ova opcija nije pogodna za Vas, odmah se obratite svom lekaru kako biste uzeli duplu dozu leka Escapelle (tj. 2 tablete odjednom).
- Ako već koristite redovnu metodu zaštite od trudnoće, kao što su pilule za kontracepciju, možete nastaviti da ih uzimate u uobičajeno vreme.

Ukoliko imate još jedan nezaštićen polni odnos nakon što ste uzeli lek Escapelle (posebno ako se to desi tokom istog menstrualnog ciklusa), tabletu neće ostvariti svoj kontraceptivni efekat i ponovo postoji rizik za trudnoću.

Šta da radite ako ste povraćali?

Ako ste povraćali u roku od tri sata nakon uzimanja tablete, treba da uzmete još jednu tabletu. Potrebno je da se odmah obratite svom farmacetu, lekaru, medicinskoj sestri ili klinici za planiranje porodice, za još jednu tabletu.

Nakon uzimanja leka Escapelle

Ako, nakon što uzmete lek Escapelle, želite da imate polne odnose, a ne koristite kontraceptivne pilule, treba da koristite kondom ili dijafragmu uz spermicidna sredstva do sledećeg menstrualnog krvarenja. Razlog je to što lek Escapelle neće delovati ako ponovo imate nezaštićeni polni odnos pre sledećeg menstrualnog krvarenja.

Savetuje se da zakažete posetu lekaru tri nedelje nakon što uzmete lek Escapelle, kako biste potvrdili da je tabletu delovala. Ako Vam menstruacija kasni više od 5 dana, ili je neuobičajeno oskudna, ili neuobičajeno

obilna, treba što pre da se javite Vašem lekaru. Ako ipak zatrudnite uprkos uzimanju ovog leka, važno je da se javite lekaru.

Vaš lekar će Vas, takođe, upoznati sa dugoročnim metodama kontracepcije koje Vas efikasnije štite od trudnoće.

Ako nastavite da koristite redovnu hormonsku kontracepciju, kao što je kontraceptivna pilula, i ne dobijete krvarenje tokom perioda kada ne uzimate pilulu, posetite svog lekara kako biste se uverili da niste trudni.

Vaš menstrualni ciklus nakon uzimanja leka Escapelle

Nakon što uzmete lek Escapelle Vaš menstrualni ciklus će biti normalan i menstruacija će početi uobičajenog dana; međutim, u nekim slučajevima menstruacija može početi nekoliko dana kasnije ili ranije. Ako dobijete menstruaciju 5 dana kasnije nego što ste očekivali ili Vam se u očekivano vreme javi neuobičajeno krvarenje, kao i ako pomislite da ste u drugom stanju, treba da proverite da li ste trudni, koristeći test za trudnoću.

Ako ste uzeli više leka Escapelle nego što treba

Iako nisu zabeležena teška neželjena dejstva nakon uzimanja većeg broja tableta odjednom, mogu Vam se javiti mučnina, povraćanje ili vaginalno krvarenje. Treba da se obratite svom farmaceutu, lekaru, medicinskoj sestri ili klinici za planiranje porodice za savet, i to naročito ukoliko ste povraćali, jer u tom slučaju tableta možda nije delovala kako treba.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se javе kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se javе kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- Mučnina
- Neredovna krvarenja do sledećeg ciklusa
- Bol u donjem delu stomaka
- Umor
- Glavobolja

Česta neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- Povraćanje. Ako povraćate, pročitajte deo „Šta da radite ako ste povraćali”.
- Poremećaj menstrualnog ciklusa. Većina žena će imati normalno menstrualno krvarenje koje će se javiti u uobičajeno vreme, ali kod nekih može doći do ranijeg ili kasnijeg otpočinjanja krvarenja. Takođe, možete imati neredovna ili tačkasta krvarenja do sledećeg ciklusa. Ukoliko Vam menstruacija kasni više od 5 dana, ili je neuobičajeno oskudna ili neuobičajeno obilna, morate se što je pre moguće obratiti Vašem lekaru.
- Osetljivost dojki, proliv ili vrtoglavica nakon uzimanja ovog leka.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- Osip
- Koprivnjača
- Svrab
- Oticanje lica
- Bol u karlici
- Bolna menstruacija
- Bol u stomaku

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Escapelle

Čuvati lek van vidokruga i domaćaja dece.

Ne smete koristiti lek Escapelle posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Escapelle

- Aktivna supstanca je: levonorgestrel
Jedna tableta sadrži 1,5 mg levonorgestrela.
- Pomoćne supstance su: skrob, krompirov; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk; laktosa, monohidrat.

Kako izgleda lek Escapelle i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, skoro bele tablete, prečnika oko 8 mm, sa utisnutom oznakom „G00“ sa jedne strane.

Unutrašnje pakovanje je aluminijum/PVC blister sa 1 tabletom. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži jedan blister (ukupno jedna tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT, Vladimira Popovića 6, Beograd

Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Budimpešta, Gyömroi út 19-21, Mađarska.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2019.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-02952-18-001 od 15.04.2019.

UPUTSTVO ZA LEK



Postinor®-2, 0,75 mg, tablete

levonorgestrel

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Postinor-2 i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Postinor-2
3. Kako se uzima lek Postinor-2
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Postinor-2
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Postinor-2 i čemu je namenjen

Lek Postinor-2 je hitan (urgentan) kontraceptiv koji može da se primeni u roku od 72 sata (3 dana) nakon nezaštićenog polnog odnosa ili neuspeha kontraceptivne metode.

Lek Postinor-2 sadrži levonorgestrel, sintetsku aktivnu supstancu sličnu luteinizirajućem hormonu.

Lek Postinor-2 sprečava približno 84% očekivanih trudnoća ukoliko se primeni u roku od 72 sata (3 dana) nakon nezaštićenog polnog odnosa. Lek Postinor-2 neće sprečiti trudnoću u svim slučajevima i efikasniji je ako se tablete uzmu što je pre moguće nakon nezaštićenog polnog odnosa. Bolje je da lek uzmete unutar prvih 12 sati, nego da odlažete do trećeg dana.

Smatra se da lek Postinor-2 deluje tako što:

- sprečava da Vaši jajnici oslobođe jajnu ćeliju;
- sprečava spermatozoide da oplode već oslobođenu jajnu ćeliju.

Prema tome, lek Postinor-2 sprečava trudnoću samo ako ga uzmete u roku od 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa. Ne deluje ukoliko ste već trudni. Ako imate nezaštićeni polni odnos nakon što uzmete lek Postinor-2, on vas neće zaštитiti od trudnoće.

Lek Postinor-2 nije namenjen za primenu pre prvog menstrualnog krvarenja (menarhe).

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Postinor-2

Lek Postinor-2 ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na levonorgestrel ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Ukoliko se bilo šta od dolenavedenog odnosi na Vas, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete lek Postinor-2 kao hitnu kontracepciju jer možda nije pogodan za Vas. Lekar Vam može propisati drugu vrstu hitne kontracepcije.

- Ako ste u drugom stanju ili mislite da ste možda u drugom stanju. Ovaj lek neće delovati ako ste već trudni. Ako ste već u drugom stanju, lek Postinor-2 ne može da prekine trudnoću jer nije „tableta za abortus”.

Možda ste već trudni ako:

- Vaš menstrualni ciklus kasni duže od 5 dana, ili ako u vreme kada očekujete menstruaciju imate neuobičajeno krvarenje
- ste imali nezaštićeni seksualni odnos pre više od 72 sata, a nakon poslednje menstruacije.

Upotreba leka Postinor-2 se ne preporučuje ako:

- imate bolest tankog creva (kao što je Kronova bolest) zbog koje može biti znatno umanjena resorpcija leka iz creva
- imate teških problema sa jetrom
- ste ikada imali vanmateričnu trudnoću (kada se beba razvijala izvan materice)
- ste ikada imali bolest zvanu salpingitis (zapaljenje jajovoda).

Prethodne vanmaterične trudnoće ili prethodne infekcije jajovoda povećavaju rizik za nastanak nove vanmaterične trudnoće.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, lek Postinor-2 možda nije pogodan za Vas ili bi druga vrsta hitne kontracepcije bila bolja.

Sve žene treba da uzmu hitnu kontracepciju što je pre moguće posle nezaštićenog polnog odnosa. Postoje neki dokazi da efikasnost leka Postinor-2 može biti smanjena sa povećanjem telesne mase ili indeksa telesne

mase (engl. *body mass index*, BMI), ali ovi podaci su ograničeni i ne omogućavaju donošenje konačnih zaključaka. Stoga se lek Postinor-2 i dalje preporučuje svim ženama, bez obzira na telesnu masu ili BMI.

Savetuje se da potazgovarate sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate nedoumica vezanih za urgentnu kontracepciju.

Deca i adolescenti

Lek Postinor-2 nije indikovan za primenu pre prvog menstrualnog krvarenja (menarhe).

Ako ste zabrinuti zbog seksualno prenosivih bolesti

Ako niste koristili kondom (ili ako je spao ili se pocepao) tokom polnog odnosa, postoji mogućnost da dobijete seksualno prenosivu bolest ili HIV virus.

Ovaj lek Vas ne može zaštiti od seksualno prenosivih bolesti, to može samo korišćenje kondoma.

Ako ste zabrinuti zbog ovoga obratite se svom lekaru, savetovalištu za planiranje porodice ili farmaceutu.

Drugi lekovi i Postinor-2

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Neki lekovi mogu da spreče efikasno delovanje leka Postinor-2. Ukoliko ste uzimali bilo koji od dolenavedenih lekova tokom prethodne 4 nedelje, lek Postinor-2 možda nije pogodan za Vas. Lekar Vam može propisati drugu vrstu (nehormonske) hitne kontracepcije, tj. intrauterini dostavni sistem sa bakrom. Ukoliko ova opcija nije pogodna za Vas ili niste u mogućnosti da odmah posetite lekara, možete uzeti duplu dozu leka Postinor-2:

- barbiturati i drugi lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije (na primer, primidon, fenitoin i karbamazepin),
- lekovi koji se koriste za lečenje tuberkuloze (na primer rifampicin, rifabutin),
- terapija HIV-a (ritonavir, efavirenz),
- lek koji se koristi za lečenje gljivičnih infekcija (grizeofulvin),
- biljni lekovi koji sadrže kantarion (*Hypericum perforatum*).

Ukoliko su Vam potrebni dalji saveti o tačnoj dozi koja Vam je potrebna, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Konsultujte svog lekara što je pre moguće nakon uzimanja tableta za dalje savete o pouzdanom obliku redovne kontracepcije i kako biste isključili mogućnost trudnoće (vidite takođe odeljak 3 „Kako se uzima lek Postinor-2” za dalje savete).

Lek Postinor-2 takođe može uticati na delovanje drugih lekova

- lek ciklosporin (koji vrši supresiju imunskog sistema).

Koliko često možete da uzimate lek Postinor-2

Lek Postinor-2 treba uzimati samo kao hitnu kontracepciju a ne kao redovnu metodu kontracepcije. Ukoliko se lek Postinor-2 uzme više od jednom u toku istog menstrualnog ciklusa, biće manje pouzdan i veća je verovatnoća da će doći do poremećaja Vašeg menstrualnog ciklusa.

Lek Postinor-2 nije efikasan kao redovne metode kontracepcije. Vaš lekar ili stručnjak u savetovalištu za planiranje porodice Vas mogu posavetovati o metodama dugotrajne kontracepcije koje su efikasnije u sprečavanju trudnoće.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća

Ovaj lek ne treba da uzmete ako ste već trudni. Ako zatrudnите i posle uzimanja ovog leka, važno je da se obratite svom lekaru. Nema dokaza da će lek Postinor-2 naškoditi vašoj bebi koja se razvija u materici, ako ga koristite kako je preporučeno. Ipak, lekar će možda hteti da proveri da se trudnoća ne razvija izvan materice. Ovo je posebno važno ako se pojavi jak bol u trbušu, nakon uzimanja leka Postinor-2 ili ako ste ranije već imali vanmateričnu trudnoću, operaciju jajovoda ili zapaljenjske bolesti organa u maloj karlici.

Dojenje

Veoma male količine aktivne supstance ovog leka mogu dospeti u majčino mleko. Ne smatra se da je ovo štetno za bebu, ali ako ste ipak zabrinuti zbog toga, možete uzeti tabletu neposredno nakon podoja i izbegavati dojenje najmanje 8 sati nakon uzimanja leka. Na ovaj način, uzećete tabletu znatno pre narednog podoja i tako smanjiti količinu aktivne supstance koju Vaša beba može da unese putem mleka.

Plodnost

Lek Postinor-2 povećava verovatnoću poremećaja menstrualnog ciklusa, što može ponekad da dovede do ranije ili kasnije ovulacije. Ove promene mogu dovesti do pomeranja plodnih dana, međutim nema podataka o uticaju na plodnost u dugoročnom periodu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja uticaja ovog leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Postinor-2 sadrži laktozu.

Ovaj lek sadrži 71,25 mg laktoze, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Postinor-2

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

- Uzmite obe tablete u isto vreme **što pre, po mogućству u roku od 12 sati**, a najkasnije 72 sata nakon što ste imali nezaštićen polni odnos. Nemojte žvakati tablete već ih progutajte cele, sa vodom ukoliko je potrebno. Nemojte odlagati uzimanje tableta. Tablete bolje deluju ukoliko ih uzmete što pre nakon nezaštićenog polnog odnosa.
- Lek Postinor-2 se može uzeti bilo kad tokom menstrualnog ciklusa, pod pretpostavkom da niste trudni ili mislite da ste trudni.
- Ako uzimate neki od lekova koji mogu da spreče lek Postinor-2 da efikasno deluje (vidite odeljak iznad „Drugi lekovi i Postinor-2“) ili ukoliko ste uzimali jedan od ovih lekova tokom prethodne 4 nedelje, efikasnost leka Postinor-2 kod Vas može biti smanjena. Vaš lekar može propisati drugu vrstu (nehormonske) hitne kontracepcije, tj. intrauterini dostavni sistem sa bakrom. Ukoliko ova opcija nije pogodna za Vas, odmah se obratite svom lekaru kako biste uzeli duplu dozu leka Postinor-2 (tj. 4 tablete istovremeno).
- Ako već koristite redovnu metodu kontracepcije, kao što su pilule za kontracepciju, možete nastaviti da ih uzimate u uobičajeno vreme.

Šta da radite ako povraćate?

Ako povraćate u roku od 3 sata nakon uzimanja tableta, treba odmah da uzmete još 2 tablete. Potrebno je da se zatim odmah obratite svom farmaceutu, lekaru ili savetovalištu za planiranje porodice.

Nakon uzimanja leka Postinor-2

Nakon što uzmete lek Postinor-2 ako želite da imate polne odnose a ne koristite kontraceptivne pilule, treba da koristite kondom ili dijafragmu u kombinaciji sa spermicidnim sredstvima. Razlog za ovo je što lek Postinor-2 neće delovati ako ponovo imate nezaštićeni polni odnos, pre Vaše sledeće menstruacije.

Savetuje se da zakažete posetu lekaru tri nedelje nakon što uzmete lek Postinor-2, kako bi se potvrdilo da je lek Postinor-2 delovao. Ako Vam menstruacija kasni duže od 5 dana ili je neuobičajeno oskudna ili neuobičajeno obilna, treba što pre da se javite svom lekaru. Ako zatrudnите uprkos uzimanju ovog leka, važno je da se javite lekaru.

Vaš lekar će Vas takođe upoznati sa metodama dugoročne kontracepcije koje Vas efikasnije štite od trudnoće.

Ako nastavite da koristite redovnu hormonsku kontracepciju, kao što je kontraceptivna pilula, i ne krvarite tokom perioda kada ne uzimate pilulu, javite se lekaru da biste proverili da niste trudni.

Vaš sledeći menstrualni ciklus nakon uzimanja leka Postinor-2

Nakon što uzmete lek Postinor-2, Vaš menstrualni ciklus je obično normalan i počinje uobičajenog dana; međutim u nekim slučajevima ciklus može da se pomeri nekoliko dana kasnije ili ranije. Ako menstruacija kasni duže od 5 dana od trenutka kada se očekuje ili se javi neuobičajeno krvarenje u to vreme, ili mislite da biste mogli biti u drugom stanju, potrebno je da proverite da li ste trudni pomoću testa za trudnoću.

Ako ste uzeli više leka Postinor-2 nego što treba

Iako nisu prijavljena ozbiljna neželjena dejstva nakon uzimanja većeg broja tableta odjednom, može Vam biti muka, možete da povratite ili može doći do vaginalnog krvarenja. U tom slučaju, potrebno je da se odmah obratite svom farmaceutu, lekaru ili savetovalištu za planiranje porodice za savet.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se javе kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se javе kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- Mučnina
- Neredovna krvarenja do sledećeg ciklusa
- Bol u donjem delu stomaka
- Zamor
- Glavobolja

Česta neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- Povraćanje. Ako se javi povraćanje, pročitajte deo „Šta da radite ako povraćate?“.
- Poremećaj menstrualnog ciklusa. Većina žena ima normalne menstrualne cikluse u očekivano vreme, ali kod nekih, menstruacija može da dođe ranije ili da kasni. Takođe možete imati neredovna krvarenja ili oskudna (tzv. tačkasta) vaginalna krvarenja do sledećeg ciklusa. Ukoliko menstruacija kasni duže od 5 dana ili se javi neuobičajeno oskudno odnosno neuobičajeno obilno menstrualno krvarenje, morate se što je pre moguće obratiti Vašem lekaru.
- Može se javiti osetljivost dojki, proliv i osećaj vrtoglavice nakon uzimanja ovog leka.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- Bol u stomaku, osip, koprivnjača, svrab, oticanje lica, bol u karlici, bolni menstrualni ciklusi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispod spisanih bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Postinor-2

Čuvati lek van vidokruga i domaćaja dece.

Ne smete koristiti lek Postinor-2 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Postinor-2

- Aktivna supstanca je: levonorgestrel. Jedna tableta sadrži 0,75 mg levonorgestrela.
- Pomoćne supstance su: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk; skrob, kukuruzni; skrob, krompirov; laktosa, monohidrat.

Kako izgleda lek Postinor-2 i sadržaj pakovanja

Skoro bele, okrugle, ravne tablete zakošenih ivica, prečnika oko 6 mm, sa utisnutom oznakom "INOR" na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Alu blister koji sadrži 2 tablete.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT, Vladimira Popovića 6, Beograd

Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Gyömrői út. 19-21, Budimpešta, Mađarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03810-18-001 od 07.06.2019.